



Instructie na een punctie zonder terugplaatsing

Aanvullende informatie voor IVF Patiënten

Deze informatie is bestemd voor patiënten die een spoed IVF behandeling ondergaan of patiënten die geen terugplaatsing krijgen.

Het is normaal dat u na de punctie enkele dagen last heeft van uw buik. Wij adviseren u de eerste dag te rusten. Daarna kunt u uw activiteiten uitbreiden. Het kan enkele weken duren voordat uw eierstokken hun normale grootte weer aangenomen hebben. In die tijd kunt u hier nog last van houden. Pas uw activiteitenpatroon aan bij klachten en neem pijnstilling als dat nodig is. Bij pijnklachten kunt u drie- tot viermaal daags twee tabletten Paracetamol 500 mg nemen. Als dit niet voldoende helpt adviseren we u contact met ons op te nemen.

Op de dag van de punctie en de dag erna kunt u nog een beetje bloed verliezen. Als dit net zoveel is als bij een menstruatie of meer, dan moet u contact opnemen met het ziekenhuis. Ook als de pijn toeneemt, erg heftig is of u verontrust, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Wij adviseren u om in de periode tussen de punctie en de eerstvolgende menstruatie geen gemeenschap te hebben of condooms te gebruiken, om te voorkomen dat u zwanger wordt.

De volgende items zijn alleen van toepassing indien aangekruist:

- Op de avond van de punctiedag start u met Provera 10 mg. U neemt gedurende 10 dagen elke dag één tablet. Aan het einde van de kuur of kort erna zult u in principe een menstruatie krijgen.
- Als u voor de punctie Letrozol heeft gebruikt moet u dit op de avond van de punctiedag hervatten. Een aantal dagen na de punctie laat u bloed prikken. U wordt aan het eind van de dag gebeld en hoort dan of u kunt stoppen met de Letrozol.
- De dag na de punctie wordt u 's ochtends tussen 9.00 uur en 11.00 uur door de IVF-verpleegkundige gebeld.
 - Zij laat u weten hoeveel eicellen bevrucht zijn. Op de derde dag na de punctie worden de embryo's, die daarvoor geschikt zijn, ingevroren. Hierover wordt u telefonisch geïnformeerd en u krijgt een schriftelijke bevestiging toegestuurd.
 - Zij laat u weten hoeveel eicellen ingevroren zijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging toegestuurd.
- Om de eierstokken tot rust te brengen schrijven wij u vanaf de punctiedag nog gedurende zeven dagen elke dag een Decapeptylinjectie 0.5mg/ml voor. Daarna kunt u stoppen met de injecties.

Contact

Als u ondanks bovenstaande uitleg nog vragen heeft, kunt u ons telefonisch bereiken via het nummer 043-387 53 60.

Voor overleg met de IVF-verpleegkundige kunt u het beste contact opnemen tussen 14.00 uur en 15.30 uur tijdens het verpleegkundig spreekuur. Op overige tijden wordt u geholpen door een doktersassistente.

Bij spoed tijdens kantooruren belt u 043-387 53 64.

Alleen voor dringende zaken buiten kantooortijden kunt u naar de dienstdoende arts op de verloskamers bellen via 043-387 62 40.

Bereikbaarheid

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25, wijk 29, Maastricht

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

T: 043-387 65 43

W: www.azm.nl

Maastricht UMC+



azM en UM werken samen onder de naam Maastricht UMC+